

防範家禽流行性感冒（寵物鳥）

廣告

禽流感簡介：

- 家禽流行性感冒（簡稱禽流感），為一種 RNA 病毒，含有 8 段基因，依病毒表面的 H 抗原及 N 抗原分為許多亞型。
- 高、低病原性禽流感是依據病毒對家禽的感染性與致病性加以判定，病毒絕大部分為低病原性，高病原性病毒株則佔極少部分，但是於商業家禽場發生會造成高傳染性及高死亡率。
- 病毒對外界環境抵抗力不強，對熱敏感，對市售的各類消毒藥劑皆具感受性。

感受性動物：

- 禽流感為禽鳥間傳播的動物傳染病，目前 H5N1 及 H7N9 發生跨物種傳播感染人之病例。
- 目前已有超過 13 目 90 種之野鳥曾被分離出禽流感病毒，其中以雁鴨目的野生鳥類包括鴨、鵝、天鵝為最重要的自然保毒宿主，其他則包括會被當作寵物鳥的燕雀目與鸚鵡目的鳥類。

傳播：

- 感染禽流感鳥禽會從呼吸道分泌物及糞便中排出病毒，鳥類藉飛沫或空氣經由結膜、鼻腔或氣管吸入病毒而感染，或透過共同飲食也可能感染病毒。
- 野鳥，尤其是遷移的野生水禽，可直接或間接傳播給寵物鳥養殖場或家庭畜養的寵物鳥。
- 寵物鳥飼養於戶外時，其飲水器可能被野鳥的糞便所污染。病毒亦可藉由感染禽鳥、污染設備、飼料、蛋盒、車輛、工作人員、衣物及鞋子等的移動而在禽鳥飼養場間傳播。此外，病毒也可藉由附著在其他動物（例如啮齒類動物與節肢動物）的腳和身體來傳播。
- 由疫區國家走私進口禽鳥類為禽流感重要的傳播方式之一。
- 環境髒亂擁擠且又聚集多種不同鳥種，尤其是部分寵物鳥店中有野外捕捉而來的如麻雀、白頭翁、紅鳩等供購買作為放生用野鳥，由於各方鳥類匯聚鳥店之際，也增加了疫病感染與擴散的風險。

臨床症狀：

- 一般禽流感感染症狀多為臨床不顯性感染，特別是在野鳥間的感染。
- 高病原性家禽流行性感冒在燕雀類與鸚鵡類鳥類的潛伏期約 3~5 天。
- 不同禽流感病毒株感染寵物鳥所引起的症狀差異很大，病鳥可能沒有呈現任何明顯症狀即死亡，或可能見到羽毛逆立、綠色下痢、厭食、精神沉鬱、昏睡及神經症狀（包括步伐不協調、震顫與斜頸）等症狀，強毒株死亡率可達 30-100%。

桃園縣政府動物防疫所
疫情通報電話

03-3326742



紅領綠鸚鵡（鸚形目）



小天鵝（雁形目）



豆雁（雁形目）

註：以上圖片由台北鳥會陳王時攝

防治：

* 寵物鳥店：

- 不飼養於戶外，並避免密飼及接觸野生鳥類。
- 避免將不同鳥種飼養於同一鳥籠。
- 新進鳥隻應先隔離觀察 21 天。
- 應配合動物防疫機關進行必要採樣監測工作。
- 應定期執行清潔及消毒。

* 鴿子飼養戶：

- 不飼養於戶外及接觸野生鳥類，避免野鳥、水禽入侵鴿舍或飼料存放等場所。
- 避免在水、陸禽飼養場內或鄰近地區飼養鴿子。
- 進入鴿舍前，應先以肥皂洗手並換穿專用工作衣、鞋。
- 新購入之鴿子應隔離飼養觀察 21 天，競賽歸來的鴿子最好也能實施隔離。
- 應定期執行清潔及消毒。

* 民眾：

- 不要將寵物鳥飼養於戶外。
- 不購買放生鳥或來路不明鳥類。
- 進入禽鳥飼養場所應戴口罩，尤其是抵抗力較低的小孩與老人。
- 與禽鳥或其糞便等之接觸後應徹底做好手部的清潔與消毒。

※若出現疑似案例，請立即通報所在地動物防疫機關！！

※應避免至疫區國家之養禽場、鴿舍或活禽市場參觀訪問，若從疫區返國，應沐浴、更換衣鞋並徹底消毒，回國至少 1 週後才可進入禽場。

※如發現不法走私，請撥打農委會防檢局檢舉走私專線電話：0800-039131。

~桃園縣政府動物防疫所 關心您~